

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน

primary care



B0051440

ห้องสมุดวทบ.นครราชสีมา

พิสนธิ์ จงตระกูล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Do what is right, and do it now.”

— Atul Gawande, *Better: A Surgeon's Notes on Performance*

สารบัญ

ยา

9

-
- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Allopurinol | 10 |
| 2. Antihistamine | 18 |
| 3. Azithromycin & Clarithromycin | 26 |
| 4. Cinnarizine & Flunarizine | 34 |
| 5. Colchicine | 39 |
| 6. Domperidone | 47 |
| 7. Ketoconazole | 54 |
| 8. Nicergoline & Ergot derivatives | 59 |
| 9. NSAID & Coxib | 63 |
| 10. Paracetamol | 86 |
| 11. Serratiopeptidase enzyme | 104 |
| 12. ยามบรรเทาอาการเจ็บคอผสมยาปฏิชีวนะ | 109 |

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ไม่ควรมีในสถานพยาบาล

114



“The physician should not treat the disease
but the patient who is suffering from it.”

— Maimonides

โรค

120

-
- | | |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 1. Diabetes Mellitus Type II | 121 |
| 2. Hypertension | 133 |
| 3. Hyperlipidemia & Dyslipidemia | 142 |
| 4. Upper Respiratory Infection (URI) | 163 |
| 5. Acute bronchitis | 173 |
| 6. Acute Diarrhea/Acute Gastroenteritis/Food Poisoning | 177 |
| 7. Antibiotic Prophylaxis in Simple Wound | 181 |
| 8. Antibiotic Prophylaxis in Vaginal Delivery | 187 |
| 9. Common Cold (Symptomatic Treatment) | 190 |
| • อาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เจ็บคอ | 195 |
| • อาการไอและการมีเสมหะ | 198 |
| • อาการคัดจมูก | 201 |

ตัวอย่างจลาภยาเสริมสำหรับประชาชน

202